

No.1

20年連続

2004 農業年度～2023 農業年度
グリホサート イソプロピルアミン塩 41%
出荷実績

農耕地登録除草剤

農林水産省登録 第18814号



■ 500ml



■ 2 L



■ 5 L



■ 10 L



■ 20 L

使いやすい
豊富なラインナップ



お求めやすい
ジェネリック農薬

経済的な
希釈
タイプ



葉にかけて根まで
しっかり枯らす

人や動物、環境に対して
毒性のない有効成分で
作られているので安全です。



スギナ、
竹なども



土に残らず
安心・安全

土に落ちると除草効果を
失うので、土壌汚染なく
種まき・苗の植付け前も
可能です。

土に優しく
しっかり枯らす



適用作物が豊富な
農林水産省登録品

農薬登録を
受けています

- 野菜類
- 果樹類
- 茶
- 麦類・雑穀類
- いも類
- 豆類
- 牧草
- 林木・樹木等
- 水田作物・畑作(休耕田)
- 水田作物(畦畔)

厳しい審査をクリア

- 急性毒性試験
- 薬効薬害試験
- 慢性毒性試験
(発がん性試験等)
- 残留性試験

こんな風に
使われています



農耕地



家のまわり



駐車場



空地



墓地



ソーラーパネル
敷地



マンション
敷地

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	使用量 / 10a当り		本剤の使用回数	グリホサートを含む農業の総使用回数		
				薬量 (ml)	希釈水量 (ℓ)				
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草	収穫 7 日前まで ・雑草生育期・	250～500	通常散布 50～100	3 回以内	3 回以内		
かんきつ		マルバツユクサ		1000～2000	100		5 回以内		
		スギナ		2000					
		一年生雑草	250～500	通常散布 50-100					
多年生雑草		500～1000	少量散布 25・50						
水田作物 (水稲を除く)	-	一年生雑草	耕起 20～10 日前まで ・雑草生育期・	250～500	50～100	1 回	2 回以内		
移植水稲					は種30 日前～出芽前 ・雑草生育期・ ・乾田耕起穀田・	50		2 回以内	
直播水稲			収穫 14 日前まで ・雑草生育期・	500～1000	50～100	1 回	3 回以内		
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	多年生雑草	雑草生育期	250～500	50～100	1 回	1 回		
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草		500～1000			3 回以内		
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草		250～500				1 回	
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで ・雑草生育期・	250～500	少量散布 25～50	2 回以内	2 回以内		
だいず			は種 10 日以前 ・雑草生育期・				100	1 回	3 回以内
			は種後出芽前まで ・雑草生育期・						
			野菜類 (だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、なす、ほうれんそう、レタス、アスパラガス、オリーブ(葉)、しゃくやく(薬用)、たらきのき、びわ(葉)、にんじん、ピーマン、とうがらし類、薬用ににんじんを除く)	耕起 7 日前まで ・雑草生育期・	1 回	1 回			
えだまめ			は種後出芽前 ・雑草生育期・	少量散布 25～50	3 回以内	3 回以内			
ねぎ			耕起 7 日前まで ・雑草生育期・	100			1 回		
			収穫 14 日前まで ・雑草生育期・ ・定植後畦間処理・	50～100					
			たまねぎ	耕起 7 日前まで ・雑草生育期・				100	
トマト、きゅうり、なす、ほうれんそう レタス、アスパラガス、オリーブ(葉) しゃくやく(薬用)、たらきのき、びわ(葉)			耕起又は定植 7 日前まで ・雑草生育期・	少量散布 25～50			1 回	2 回以内	
だいこん、にんじん、ピーマン、とうがらし類			耕起 7 日前まで ・雑草生育期・	250～500	100	1 回	10 回以内 (1 年間に 2 回以内)		
薬用にんじん			圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫 30 日前まで ・雑草生育期・	500～1000	少量散布 25～50	1 回	3 回以内
麦類 (小麦を除く)									3 回以内
小麦				多年生雑草	500～750	50～100	2 回以内		
雑穀類				一年生雑草	耕起前又はは種付前まで ・雑草生育期・	250～500		100	2 回以内
いも類 (かんしょを除く)									耕起前 ・雑草生育期・
かんしょ	耕起前又はは種前まで ・雑草生育期・	50～100	2 回以内						
飼料用とうもろこし	一年生及び 多年生雑草	は種後出芽前まで ・雑草生育期・	250～500	50～100	2 回以内	2 回以内			
さとうきび	-	一年生雑草	摘採 7 日前まで ・雑草生育期・	250～500	50	2 回以内	6 回以内		
茶		多年生雑草					500～1000	1 回	2 回以内
牧草		牧野、草地 (更新・造成)	更新・造成の 10 日以前 ・雑草生育期・	500～1000	250～500	50	2 回以内	3 回以内	
	一年生及び 多年生雑草		は種 10 日前～は種当日 ・耕起整地後・ ・雑草発生前期・						
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類等の 多年生雑草	生育盛期以降 ・夏～秋間・	1000	30	1 回	1 回		
樹木類	-	一年生雑草	雑草生育期	250～500	50～100	4 回以内	4 回以内		
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道 等	多年生雑草		500	100	3 回以内	3 回以内		
		スギナ		1000	2000			50～100	

希釈倍率

長く、確実な除草効果

所定の時期と倍率で散布すれば、
一年生雑草から多年生雑草、
ススキ・ササ類まで根まで枯らしめます。

基本的な雑草
100倍液

・イネ科雑草
・スズメノカタビラ
・ギシギシ
等

頑固な雑草
50倍液

・セイトカアワダチソウ
・ツユクサ・クズ
・イタドリ・クログワイ
・ドクダミ・セリ
・オオバコ・タンポポ
等

スギナ
25倍液

ササ
30倍液

※ 適用作物毎に希釈倍率は異なります。

水量	サンフーロン®の量			広さ
	100倍	50倍	25倍	
5ℓ	50mℓ	100mℓ	200mℓ	30坪
10ℓ	100mℓ	200mℓ	400mℓ	60坪
20ℓ	200mℓ	400mℓ	800mℓ	120坪
50ℓ	500mℓ	1ℓ	2ℓ	300坪
100ℓ	1ℓ	2ℓ	4ℓ	600坪



ご使用の際は製品ラベル記載の
「適用作物と使用方法」をよくご確認の上、
ご使用下さい。

使用上の注意事項などについては、製品に
貼付されているラベルをご参照下さい。

サンフーロン® お客様相談窓口

ご質問、
お問い合わせは



☎ 0120-014-052

🌐 <http://sunfulon.jp/>

ご家庭、農家のみなさまをサポートします

TAISEI
NOZAI

大成農材株式会社
広島県広島市
中区鉄砲町 7-8
taiseinozai.co.jp/

農を通して豊かな暮らしを

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	希釈倍率	使用液量	使用方法	本剤の使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クズ・フジ等の つる類	生育初期	原液 又は 2倍液	つる径 2cm以下 2.1~3.0 3.1~4.0 4.1~5.0 5.1cm以上	0.5mℓ/株 1.0 1.5 2.0 適宜増量	つる注入 処理	1回
		落葉雑草かん木	生育期 (5~10月)		1mℓ/カ所 樹径 10cm以下 10~20cm 20cm以上	2~3カ所 4~8 10	立木注入 処理	
	林地 放置竹林	竹類	夏期		5~10mℓ/本		竹稈注入 処理	