

# 枯れ残るイネ科雑草

## 根絶! しっかり枯らす!



オヒシバ

無処理



アフターエイド1ℓ/10a  
水量100ℓ/10a

2018社内試験 (対象雑草オヒシバ)  
沖縄県糸満市4月25日処理 散布35日後

### オヒシバ防除の注意点

※草丈 30 cm以下の出穂前に散布

※水量100ℓ/10aでキリナシノズルでの散布がおススメです。  
(目安:約10秒/m<sup>2</sup>)

※アフターエイドフロアブル散布前に、その他の除草剤を登録  
範囲を超える高薬量・高頻度で散布した場合アフターエイド  
フロアブルの効果が劣る場合があります。



キリナシノズル  
動力用



ラウンドノズル25  
動力用



イタリアンライグラス (ネズミムギ)

無処理



アフターエイド1ℓ/10a  
水量100ℓ/10a

2016社内試験 (対象雑草イタリアンライグラス) 静岡県袋井市11月17日処理 散布104日後

イネ科雑草対象茎葉処理除草剤

# アフターエイド フロアブル

®は日産化学(株)の登録商標

# もし散布時に広葉雑草などが混在する場合は、 ラウンドアップマックスロードと混用がおすすめ!

枯れ残るイネ科雑草と併せて広葉雑草を枯らすことができます。

## ■オヒシバでの混用防除(例)



\*散布適期に適正薬量を株元にしっかりと!  
\*オヒシバを枯殺するまでには約2~4週間を要します。



オヒシバ発生揃期から出穂前まで(草丈30cm以下)に散布  
2018 社内試験(対象雑草オヒシバ)茨城県常総市7月27日処理  
アフターエイド1ℓ/10a+ラウンドアップマックスロード500ml/10a 水量100ℓ/10a

## ■イタリアンライグラス(ネズミムギ)での混用防除(例)

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

秋冬期発生揃期(草丈20cm以下)

春期開花前伸長期(草丈30cm以下)

アフターエイド1ℓ/10a+  
ラウンドアップマックスロード1ℓ/10a  
水量100ℓ/10a

アフターエイド1ℓ/10a+  
ラウンドアップマックスロード500ml/10a  
水量100ℓ/10a

アフターエイドと、ラウンドアップマックスロード以外の除草剤との混用で、ノズルの詰りや噴霧機の破損事例が発生しています。ラウンドアップマックスロード以外の除草剤とは絶対に混用しないでください。ラウンドアップマックスロードとの混用後も即散布いただき、散布後は即洗浄をお願いします。

※今までの試験による知見をもとに作成されていますが、気象条件や散布時期により異なる結果が得られることも予想されます。よって、混用による使用を保障するものではなく、あくまで参考事例としてお取り扱いください。  
※混用にあたっては各薬剤の製品ラベルをよく読み、登録内容の確認を充分に行ってください。

### 適用病害虫の範囲及び使用方法 (令和6年3月現在)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量		本剤の使用回数	使用方法	キザロホップエチルを含む農薬の総使用回数
				薬量(mℓ)	希釈水量(ℓ)			
かんぎつ かき	—	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 収穫7日前まで	500~ 1000	100	2回以内	雑草茎葉 散布	2回以内
ぶどう					通常散布 50~100			
りんご					少量散布 25~50			
もも								
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び 多年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期	500~ 1000	通常散布 50~100 少量散布 25~50	3回以内	植栽地を除く樹 木等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内
樹木類	公園、堤とう、駐車場、 道路、運動場、宅地、 のり面、鉄道等							

### △ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使い切ること。
  - 散布液の調整に当たっては、本剤の所要量を所定量の水にうすめ、良くかき混ぜてから散布すること。
  - 本剤の散布時期は雑草生育期(草丈30cm以下)であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので時期を失いように散布すること。
  - 広葉雑草及びカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占ほ場で使用すること。なお、広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用すること。
  - 雑草茎葉にかかるよう散布すること。
  - イネ科雑草を完全に枯殺するまでには約2~4週間を要し、冬期などの低温の場合には更に期間を要する場合があるので、誤って撒き直しなどしないように注意すること。
  - 出穂期以降など、雑草の生育が停滞している場合には、効果が劣ることがあるので登録内の高薬量
- を使用し、効果が不十分な場合には他の除草剤との体系処理などで防除すること。  
(8) 激しい降雨の予想される場合は使用をさけること。  
(9) りんご、ぶどう、ももに使用する場合には、薬液が作物にかからないように注意して散布すること。  
(10) 少量散布(25~50ℓ/10a)の場合は、専用ノズルを使用すること。  
(11) イネ科作物には薬害のおそれがあるので、周囲にイネ科作物がある場合は、薬剤が飛散しないように注意して散布すること。  
(12) 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。  
(13) 水溜池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意すること。  
(14) 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は、環境に影響を与えないよう適切に処理すること。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

農林水産省登録  
第24105号

商品名:アフターエイドフロアブル  
容量:500ml  
有効成分:キザロホップエチル……………7.0%  
水、界面活性剤等……………93.0%  
分類:普通物\*(※毒劇物に該当しないものを指す)

この製品に関するお問合せ:ラウンドアップお客様相談窓口  
0120-209374(平日9:00~12:00 13:00~17:00)

 日産化学株式会社

〒103-6119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号  
R-AA-共-001